



38ª Informação do GT Estenfiliose

11 de novembro de 2020


O INIAV, I.P., como coordenador do GT Estenfiliose, informa que na **semana 45** (2 a 9 de novembro) os resultados da monitorização foram os seguintes:

Número médio de conídios

O número médio de conídios / semana / cm² / pomar **aumentou ligeiramente** no pomar da Picançeira, **manteve-se** no pomar de Alcobaça e **diminuiu** nos restantes pomares monitorizados (gráfico 1).

Os pomares da Sobrena e da Picançeira foram os que apresentaram **maior** número médio de conídios por centímetro quadrado (1,7), seguiram-se os pomares da Maiorga (1,0) e de Alcobaça (0,6).

Gráfico 1 - Número médio de conídios/semana/cm²/pomar




Número médio de ascósporos

O número médio de ascósporos / semana / cm² / pomar **aumentou ligeiramente** nos pomares da Maiorga e de Alcobaça e **manteve-se** nos restantes pomares monitorizados (gráfico 2).



Esta semana, o pomar que apresentou o **maior** número médio de ascósporos por centímetro quadrado foi o da Maiorga (0,2), seguido pelo pomar de Alcobaça (0,1). Não se observaram ascósporos nos pomares da Sobrena e da Picanceira.

Gráfico 2 - Número médio de ascósporos/semana/cm²/pomar




Número médio de esporos

O número médio de esporos (conídios + ascósporos) / semana / cm² / pomar **aumentou ligeiramente** nos pomares da Picanceira e de Alcobaça e **diminuiu** nos restantes pomares monitorizados (gráfico 3).

Os pomares que apresentaram **maior** número médio de esporos por centímetro quadrado foram, com o **mesmo valor**, os da Sobrena e da Picanceira (1,7), seguiram-se os pomares da Maiorga (1,2) e de Alcobaça (0,7).




Gráfico 3 - Número médio de esporos/semana/cm²/pomar




Comparação do número médio de esporos de 2019 em relação a 2020

Comparando o número médio de esporos / semana / cm² / pomar de 2019 com os da mesma semana de 2020, verifica-se que os valores deste ano são inferiores 3,2 vezes no pomar da Maiorga, 2,0 vezes no pomar da Sobrena, 1,6 vezes no pomar de Alcobaça e 1,3 vezes no pomar da Picanceira (gráfico 4).

Gráfico 4 - Número médio de esporos/semana/cm²/pomar 2019



A responsabilidade do conteúdo desta informação é do INIAV, I.P.



Grupo de Trabalho para a Estenfiliose

O **GT Estenfiliose** agradece à **AARA**, **APAS** e **CAMPOTEC** a disponibilização dos pomares.

O Coordenador do GT Estenfiliose

Entidades Financiadoras desta informação:

Organizações de produtores:



Empresas:

