



14ª Informação do GT Estenfiliose

7 de maio de 2025

O INIAV, I.P., como coordenador do GT Estenfiliose, informa que na **semana 18** (28 de abril a 5 de maio) **os resultados da monitorização** foram os seguintes:

Número médio de conídios

O número médio de conídios/cm², por semana, por pomar, **diminuiu acentuadamente** no pomar da Maiorga, **diminuiu moderadamente** no pomar da Sobrena, **aumentou ligeiramente** no pomar de Alcobaça e **aumentou acentuadamente** no pomar da Picanceira (gráfico 1).




Gráfico 1 - Número médio de conídios/cm², por semana, por pomar.

O pomar da Picanceira apresentou o **maior** número médio de conídios/cm² (1,6), seguido pelos pomares da Sobrena (1,3), da Maiorga (0,8) e de Alcobaça (0,6).

Número médio de ascósporos

O número médio de ascósporos/cm², por semana, por pomar, **manteve-se** nos pomares da Sobrena, da Maiorga e de Alcobaça e **aumentou acentuadamente** no pomar da Picanceira (gráfico 2).

O pomar da Sobrena apresenta o **maior** número médio de ascósporos/cm² (0,1) seguido pelo pomar da Picanceira (0,1). Os

pomares da Maiorga e de Alcobaça **não registaram a presença de ascósporos**.




Gráfico 2 - Número médio de ascósporos/cm², por semana, por pomar.

Número médio de esporos

O número médio de esporos/cm² (conídios + ascósporos), por semana, por pomar, **diminuiu acentuadamente** no pomar da Maiorga, **diminuiu moderadamente** no pomar da Sobrena, **aumentou ligeiramente** no pomar de Alcobaça e **aumentou acentuadamente** no pomar da Picanceira (gráfico 3).




Gráfico 3 - Número médio de esporos/cm², por semana, por pomar.

O pomar da Picanceira apresentou o **maior** número médio de esporos/cm², (1,7), seguido

pelos pomares da Sobrena (1,5), da Maiorga (0,8) e de Alcobaça (0,6).

Comparação do número médio de esporos de 2025 com a média dos oito anos de monitorização (2017 a 2024)

Comparando a média de 2017 até 2024* do número médio de esporos/cm², por semana, por pomar, com os da **mesma semana** (semana 18) de **2025** (gráfico 4), verifica-se que os valores **deste ano** são **inferiores** 17,9 vezes no pomar da Maiorga; 6,0 vezes no pomar da Sobrena; 4,8 vezes no pomar de Alcobaça e 2,5 vezes no pomar da Picanceira.




Gráfico 4 - Comparação do número médio de esporos/cm², por semana, por pomar de 2025, com média dos anos de 2017 a 2024.

***Nota:** A média de esporos/cm², por semana, do pomar da Picanceira é referente unicamente aos últimos seis anos de monitorização (2019 a 2024), devido a este pomar ter substituído o da Silveira no final de 2018.

Número médio de folhas com sintomas de estenfiliose

O número médio de folhas com sintomas de estenfiliose por lançamento jovem, por semana, por pomar, **manteve-se** em todos os pomares monitorizados (gráfico 5).

O pomar da Picanceira apresenta o **maior** número médio de folhas com sintomas (0,6), seguido pelos pomares da Sobrena e da Maiorga (0,1). O pomar de Alcobaça **não** registou a presença de sintomas.




Gráfico 5 - Número médio de folhas com sintomas de estenfiliose, por ramo, por semana, por pomar.

Estados fenológicos dos pomares

No dia **5 de maio**, as árvores monitorizadas encontravam-se nos seguintes estados fenológicos:

	Baggiolini	BBCH
Sobrena	H	69
Picanceira	H	69
Maiorga	F2	65
Alcobaça	G	67

A responsabilidade do conteúdo desta informação é do INIAV, I.P.

O GT Estenfiliose agradece à AARA, APAS, CAMPOTEC e ao INIAV, I.P. / ENFVN a disponibilização dos pomares.

O Coordenador do GT Estenfiliose

Entidades Financiadoras desta informação:

