



41ª Informação do GT Estenfiliose


31 de outubro de 2023

O INIAV, I.P., como coordenador do GT Estenfiliose, informa que na **semana 43** (23 a 30 de outubro) **os resultados da monitorização** foram os seguintes:

Número médio de conídios

O número médio de conídios/cm²/semana/pomar **diminuiu moderadamente** no pomar de Alcobaça, **diminuiu ligeiramente** no pomar da Sobrena e **aumentou moderadamente** nos pomares da Picanceira e da Maiorga (gráfico 1).

Gráfico 1 - Número médio de conídios/cm²/semana/pomar




O pomar da Picanceira apresentou o **maior** número médio de conídios/cm² (1,4), seguido pelos pomares da Sobrena e Maiorga (0,8) e de Alcobaça (0,2).

Número médio de ascósporos

O número médio de ascósporos/cm²/semana/pomar **diminuiu acentuadamente** no pomar da Picanceira e **aumentou acentuadamente** nos pomares da Sobrena, da Maiorga e de Alcobaça (gráfico 2).



Gráfico 2 - Número médio de ascósporos/cm²/semana/pomar




O pomar da Sobrena apresentou o **maior** número médio de ascósporos/cm² (1,1), seguido dos pomares da Maiorga e de Alcobaça (0,3) e o pomar da Picanceira **não registou a presença de ascósporos**.

Número médio de esporos

O número médio de esporos (conídios + ascósporos) /cm²/semana/pomar **manteve-se** no pomar Alcobaça, **aumentou ligeiramente** nos pomares da Sobrena, e da Picanceira e **aumentou moderadamente** no pomar da Maiorga (gráfico 3).

Gráfico 3 - Número médio de esporos/cm²/semana/pomar






O pomar que apresenta **maior** número médio de esporos/cm² (conídios + ascósporos) é o pomar da Sobrena (1,9), seguido pelos pomares da Picanceira (1,4) da Maiorga (1,2) e de Alcobaça (0,5).

Comparação do número médio de esporos de 2023 em relação à média dos seis anos de monitorização (2017 a 2022)

Comparando a média de 2017 até 2022* do número médio de esporos/cm²/semana/pomar com os da **mesma semana** (semana 43) de 2023 (gráfico 4), verifica-se que os valores **deste ano** são **inferiores** 5,1 vezes no pomar da Sobrena, 4,8 vezes no pomar da Maiorga, 4,6 vezes no pomar de Alcobaça e 2,6 vezes no pomar da Picanceira.

Gráfico 4 - Comparação do número médio de esporos/cm²/semana/pomar do histórico anual (2017 a 2022) com 2023



***Nota:** A média do número médio de esporos/cm²/semana/pomar, no pomar da Picanceira é referente unicamente aos últimos quatro anos de monitorização (2019 a 2022), devido a este pomar ter substituído o da Silveira no final de 2018.



A responsabilidade do conteúdo desta informação é do INIAV, I.P.

O GT Estenfiliose agradece à AARA, APAS, CAMPOTEC e ao INIAV, I.P. / ENFVN a disponibilização dos pomares.

O Coordenador do GT Estenfiliose

Entidades Financiadoras desta informação:

Organizações de produtores:



Empresas:

