



38ª Informação do GT Estenfiliose


09 de outubro de 2024

O INIAV, I.P., como coordenador do GT Estenfiliose, informa que na **semana 40** (30 de setembro a 7 de outubro) **os resultados da monitorização** foram os seguintes:

Número médio de conídios

O número médio de conídios/cm²/semana/pomar **diminuiu acentuadamente** em todos os pomares monitorizados (gráfico 1).

Gráfico 1 - Número médio de conídios/cm²/semana/pomar




O pomar da Sobrena apresentou o **maior** número médio de conídios/cm² (8,7), seguido pelos pomares da Picanceira (2,1), da Maiorga (1,1) e de Alcobaça (0,1).

Número médio de ascósporos

O número médio de ascósporos/cm²/semana/pomar **diminuiu acentuadamente** no pomar da Maiorga e **manteve-se** nos pomares da Sobrena, da Picanceira e de Alcobaça (gráfico 2).



Gráfico 2 - Número médio de ascósporos/cm²/semana/pomar




O pomar da Sobrena e da Picanceira apresentaram o **maior** número médio de ascósporos/cm² (0,1). Os pomares da Maiorga e de Alcobaça **não registaram a presença de ascósporos**.

Número médio de esporos

O número médio de esporos (conídios + ascósporos)/cm²/semana/pomar **diminuiu acentuadamente** em todos os pomares monitorizados (gráfico 3).

Gráfico 3 - Número médio de esporos/cm²/semana/pomar






O pomar da Sobrena apresentou o **maior** número médio de esporos/cm² (conídios + ascósporos) (8,8), seguido pelos pomares da Picanceira (2,2), da Maiorga (1,1) e de Alcobaça (0,1).

Comparação do número médio de esporos de 2024 em relação à média dos sete anos de monitorização (2017 a 2023)

Comparando a média de 2017 até 2023* do número médio de esporos/cm²/semana/pomar com os da **mesma semana** (semana 40) de 2024 (gráfico 4), verifica-se que os valores **deste ano** são **inferiores** 14,1 vezes no pomar de Alcobaça, 3,7 vezes no pomar da Maiorga 1,8 vezes no pomar da Picanceira e **superiores** 1,1 vezes no pomar da Sobrena.

Gráfico 4 - Comparação do número médio de esporos/cm²/semana/pomar do histórico anual (2017 a 2023) com 2024



***Nota:** O histórico anual do pomar da Picanceira é referente unicamente aos últimos cinco anos de monitorização (2019 a 2023), devido a este pomar ter substituído o da Silveira no final de 2018.

A responsabilidade do conteúdo desta informação é do INIAV, I.P.

O GT Estenfiliose agradece à AARA, APAS, CAMPOTEC e ao INIAV, I.P. / ENFVN a disponibilização dos pomares.



Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo

Grupo de Trabalho para a Estenfiliose

O Coordenador do GT Estenfiliose

Entidades Financiadoras desta informação:

Organizações de produtores:



Empresas:

