


Gráfico 2 - Número médio de ascósporos/semana/cm²/pomar






Esta semana, o pomar que apresentou o **maior** número médio de ascósporos por centímetro quadrado foi o da Sobrena (5,4), seguido pelos pomares da Maiorga (4,8), da Picanceira (4,0) e de Alcobaça (2,6).

Número médio de esporos

O número médio de esporos (conídios + ascósporos) / semana / cm² / pomar **aumentou ligeiramente** no pomar de Alcobaça e **acentuadamente** nos restantes pomares monitorizados (gráfico 3).

Gráfico 3 - Número médio de esporos/semana/cm²/pomar





Grupo de Trabalho para a Estenfiliose

Percentagem média de folhas com sintomas de estenfiliose

Nesta semana, apesar das folhas dos ramos marcados ainda não apresentarem sintomas, já se observaram algumas folhas com estenfiliose nos pomares monitorizados.

Estados fenológicos dos pomares (Baggiolini / BBCH)

No dia 12 de abril, o **estado fenológico** de maior parte das árvores do pomar da Sobrena encontrava-se no **J / 72**, enquanto nos restantes pomares monitorizados encontrava-se no **I / 71**.

A responsabilidade do conteúdo desta informação é do INIAV, I.P.

O GT Estenfiliose agradece à AARA, APAS, CAMPOTEC e ao INIAV, I.P. / ENFVN a disponibilização dos pomares.

O Coordenador do GT Estenfiliose

Entidades Financiadoras desta informação:

Organizações de produtores:



Empresas:

