



25ª Informação do GT Estenfiliose


12 de julho de 2023

O INIAV, I.P., como coordenador do GT Estenfiliose, informa que na **semana 27** (3 a 10 de julho) **os resultados da monitorização** foram os seguintes:

Número médio de conídios

O número médio de conídios/cm²/semana/pomar **diminuiu acentuadamente** no pomar da Picanceira, **diminuiu moderadamente** no pomar da Sobrena e **aumentou ligeiramente** nos pomares da Maiorga e de Alcobaça (gráfico 1).

Gráfico 1 - Número médio de conídios/cm²/semana/pomar




O pomar da Maiorga apresentou o **maior** número médio de conídios/cm² (5,1), seguido pelos pomares da Sobrena (1,4), da Picanceira (0,7) e de Alcobaça (0,5).

Número médio de ascósporos

O número médio de ascósporos/cm²/semana/pomar **diminuiu acentuadamente** nos pomares da Sobrena e da Picanceira e **manteve-se** nos pomares da Maiorga e de Alcobaça (gráfico 2).



Gráfico 2 - Número médio de ascósporos/cm²/semana/pomar




Os pomares monitorizados não registaram a presença de ascósporos.

Número médio de esporos

O número médio de esporos (conídios + ascósporos) /cm²/semana/pomar **diminuiu acentuadamente** no pomar da Picanceira, **diminuiu moderadamente** no pomar da Sobrena e **aumentou ligeiramente** nos pomares da Maiorga e de Alcobaça (gráfico 3).

Gráfico 3 - Número médio de esporos/cm²/semana/pomar






O pomar que apresenta **maior** número médio de esporos/cm² (conídios + ascósporos) é o pomar da Maiorga (5,1), seguido pelos pomares da Sobrena (1,4), da Picanceira (0,7) e de Alcobaça (0,5).

Comparação do número médio de esporos de 2023 em relação à média dos seis anos de monitorização (2017 a 2022)

Comparando a média de 2017 até 2022* do número médio de esporos/cm²/semana/pomar com os da **mesma semana** (semana 27) de 2023 (gráfico 4), verifica-se que os valores **deste ano** são **inferiores** 20,2 vezes no pomar de Alcobaça e 13,5 vezes nos pomares da Picanceira, 13,4 vezes no pomar da Sobrena e 3,1 vezes no pomar da Maiorga.

Gráfico 4 - Comparação do número médio de esporos/cm²/semana/pomar do histórico anual (2017 a 2022) com 2023




***Nota:** A média do número médio de esporos/cm²/semana/pomar, no pomar da Picanceira é referente unicamente aos últimos quatro anos de monitorização (2019 a 2022), devido a este pomar ter substituído o da Silveira no final de 2018.



Número médio de folhas com sintomas de estenfiliose

O número médio de folhas com sintomas de estenfiliose / lançamento jovem / semana / pomar na **semana 28** (10 de julho) **aumentou ligeiramente** nos quatro pomares monitorizados (gráfico 5).

Gráfico 5 - Número médio de folhas com sintomas/ramo/semana/pomar




O pomar da Picanceira foi o que apresentou o **maior** número de folhas com sintomas de estenfiliose (6,1), seguido dos pomares da Sobrena (5,4), da Maiorga (5,3) e de Alcobaça (5,1).

Percentagem média de frutos com sintomas de estenfiliose

A percentagem média de frutos com sintomas de estenfiliose / semana / pomar na **semana 28** (10 de julho) **manteve-se** nos pomares da Picanceira e de Alcobaça e **aumentou ligeiramente** nos pomares da Sobrena e da Maiorga (gráfico 6).



Gráfico 6 - Percentagem de frutos com sintomas/semana/pomar



O pomar da Maiorga foi o que apresentou a **maior** percentagem de frutos com sintomas (70,8%), seguiram-se os pomares da Sobrena (66,7%), da Picanceira (16,7%) e Alcobaça (2,1%).

A responsabilidade do conteúdo desta informação é do INIAV, I.P.

O GT Estenfiliose agradece à AARA, APAS, CAMPOTEC e ao INIAV, I.P. / ENFVN a disponibilização dos pomares.

O Coordenador do GT Estenfiliose



Grupo de Trabalho para a Estenfiliose

Entidades Financiadoras desta informação:

Organizações de produtores:



Empresas:

