



30ª Informação do GT Estenfiliose


14 de agosto de 2024

O INIAV, I.P., como coordenador do GT Estenfiliose, informa que na **semana 32** (5 a 12 de agosto) **os resultados da monitorização** foram os seguintes:

Número médio de conídios

O número médio de conídios/cm²/semana/pomar **diminuiu acentuadamente** nos pomares da Picanceira e da Maiorga, **diminuiu moderadamente** no pomar da Sobrena e **diminuiu ligeiramente** no pomar de Alcobaça (gráfico 1).

Gráfico 1 - Número médio de conídios/cm²/semana/pomar




O pomar da Sobrena apresentou o **maior** número médio de conídios/cm² (2,3), seguido pelos pomares da Picanceira e da Maiorga (1,2) e de Alcobaça (1,0).

Número médio de ascósporos

O número médio de ascósporos/cm²/semana/pomar **manteve-se** em todos os pomares monitorizados (gráfico 2).



Gráfico 2 - Número médio de ascósporos/cm²/semana/pomar




Os pomares monitorizados **não registaram a presença de ascósporos**.

Número médio de esporos

O número médio de esporos (conídios + ascósporos)/cm²/semana/pomar **diminuiu acentuadamente** nos pomares da Picanceira e da Maiorga, **diminuiu moderadamente** no pomar da Sobrena e **diminuiu ligeiramente** no pomar de Alcobaça (gráfico 3).

Gráfico 3 - Número médio de esporos/cm²/semana/pomar






O pomar da Sobrena apresentou o **maior** número médio de esporos/cm² (conídios + ascósporos) (2,3), seguido pelos pomares da Picanceira e da Maiorga (1,2) e de Alcobaça (1,0).

Comparação do número médio de esporos de 2024 em relação à média dos sete anos de monitorização (2017 a 2023)

Comparando a média de 2017 até 2023* do número médio de esporos/cm²/semana/pomar com os da **mesma semana** (semana 32) de 2024 (gráfico 4), verifica-se que os valores **deste ano** são **inferiores** 9,7 vezes no pomar da Maiorga, 9,4 vezes no pomar da Sobrena, 7,4 vezes no pomar da Picanceira e 6,3 vezes no pomar de Alcobaça.

Gráfico 4 - Comparação do número médio de esporos/cm²/semana/pomar do histórico anual (2017 a 2023) com 2024



***Nota:** O histórico anual do pomar da Picanceira é referente unicamente aos últimos cinco anos de monitorização (2019 a 2023), devido a este pomar ter substituído o da Silveira no final de 2018.


Número médio de folhas com sintomas de estenfiliose

O número médio de folhas com sintomas de estenfiliose / lançamento jovem / semana / pomar na **semana 33** (12 de agosto) **aumentou ligeiramente** nos



pomares da Sobrena e de Alcobaça e **manteve-se igual** nos pomares da Picanceira e da Maiorga (gráfico 5).

Gráfico 5 - Número médio de folhas com sintomas/ramo/semana/pomar



O pomar da Picanceira apresentou **maior** número de folhas com sintomas de estenfiliose (10,2), seguido dos pomares da Sobrena (9,7), da Maiorga (8,0) e de Alcobaça (5,5).


Percentagem média de frutos com sintomas de estenfiliose

A percentagem média de frutos com sintomas de estenfiliose / semana / pomar na **semana 33** (12 de agosto) aumentou acentuadamente no pomar da Sobrena, aumentou ligeiramente no pomar da Picanceira e **manteve-se** no pomar de Alcobaça (gráfico 6). O pomar da Maiorga já foi colhido.

O pomar da Picanceira foi o que apresentou a **maior** percentagem de frutos com sintomas (57,4%), seguiram-se os pomares da Sobrena (17,9%) e de Alcobaça (1,5%).



Gráfico 6 - Percentagem de frutos com sintomas/semana/pomar



A responsabilidade do conteúdo desta informação é do INIAV, I.P.

O GT Estenfiliose agradece à AARA, APAS, CAMPOTEC e ao INIAV, I.P. / ENFVN a disponibilização dos pomares.

O Coordenador do GT Estenfiliose

Entidades Financiadoras desta informação:

Organizações de produtores:



Empresas:

