







Grupo de Trabalho para a Estenfiliose


### 38ª Informação do GT Estenfiliose

22 de outubro de 2025

O INIAV, I.P., como coordenador do GT Estenfiliose, informa que na semana 42 (13 a 20 de outubro) os resultados da monitorização foram os seguintes:

#### Número médio de conídios

O número médio de conídios/cm², por semana, por pomar, diminuiu acentuadamente no pomar da Sobrena, diminuiu moderadamente nos pomares da Picanceira e de Alcobaça e diminuiu ligeiramente no pomar da Maiorga (gráfico 1).




**Gráfico 1 -** Número médio de conídios/cm², por semana, por pomar.

O pomar da Maiorga apresentou o **maior** número médio de conídios/cm<sup>2</sup> (1,1), seguido pelos pomares da Picanceira (0,6), de Alcobaça (0,3) e da Sobrena (0,2).

#### Número médio de ascósporos

O número médio de ascósporos/cm², por semana, por pomar, **diminuiu** acentuadamente nos pomares da Sobrena e da Picanceira e manteve-se nos pomares da Maiorga e de Alcobaça (gráfico 2).


Os pomares monitorizados **não registaram a presença de ascósporos**.



**Gráfico 2 -** Número médio de ascósporos/cm², por semana, por pomar.

#### Número médio de esporos

O número médio de esporos/cm² (conídios + ascósporos), por semana, por pomar, diminuiu acentuadamente no pomar da Sobrena, diminuiu moderadamente nos pomares da Picanceira e de Alcobaça e diminuiu ligeiramente no pomar da Maiorga (gráfico 3).




**Gráfico 3 -** Número médio de esporos/cm², por semana, por pomar.

O pomar da Maiorga apresentou o **maior** número médio de esporos/cm<sup>2</sup> (1,1), seguido pelos pomares da Picanceira (0,6), de Alcobaça (0,3) e da Sobrena (0,2).

# Comparação do número médio de esporos de 2025 com a média dos oito anos de monitorização (2017 a 2024)

Comparando a média de 2017 até 2024\* do número médio de esporos/cm², por semana, por pomar, com os da mesma semana (semana 41) de 2025 (gráfico 4), verifica-se que os valores deste ano são inferiores 42,7 vezes no pomar da Sobrena; 5,1 vezes no pomar de Alcobaça e 3,0 vezes nos pomares da Picanceira e da Maiorga.



**Gráfico 4 -** Comparação do número médio de esporos/cm², por semana, por pomar de 2025, com média dos anos de 2017 a 2024.

\*Nota: A média de esporos/cm², por semana, do pomar da Picanceira é referente unicamente aos últimos seis anos de monitorização (2019 a 2024), devido a este pomar ter substituido o da Silveira no final de 2018.

A responsabilidade do conteúdo desta informação é do INIAV, I.P.

O GT Estenfiliose agradece à AARA, APAS, CAMPOTEC e ao INIAV, I.P. / ENFVN a disponibilização dos pomares.

O Coordenador do GT Estenfiliose



## Entidades Financiadoras desta informação:

