



43ª Informação do GT Estenfiliose

26 de novembro de 2025

O INIAV, I.P., como coordenador do GT Estenfiliose, informa que na **semana 46** (17 a 24 de novembro) **os resultados da monitorização** foram os seguintes:

Número médio de conídios

O número médio de conídios/cm², por semana, por pomar, **diminuiu ligeiramente** nos pomares da Sobrena e da Maiorga, **manteve-se** no pomar da Picanceira e **aumentou acentuadamente** no pomar de Alcobaça (gráfico 1).




Gráfico 1 - Número médio de conídios/cm², por semana, por pomar.

Os pomares da Picanceira e da Maiorga apresentaram o **maior** número médio de conídios/cm² (0,3), seguidos pelo pomar da Sobrena (0,2) e de Alcobaça (0,1).

Número médio de ascósporos

O número médio de ascósporos/cm², por semana, por pomar, **diminuiu ligeiramente** no pomar da Sobrena e **aumentou acentuadamente** nos restantes pomares monitorizados (gráfico 2).

Os pomares da Maiorga e de Alcobaça apresentaram o **maior** número médio de ascósporos/cm² (0,6), seguidos pelos pomares da Picanceira (0,5) e da Sobrena (0,3).




Gráfico 2 - Número médio de ascósporos/cm², por semana, por pomar.

Número médio de esporos

O número médio de esporos/cm² (conídios + ascósporos), por semana, por pomar, **diminuiu acentuadamente** nos pomares da Picanceira e de Alcobaça, **aumentou moderadamente** no pomar da Maiorga e **diminuiu ligeiramente** no pomar da Sobrena (gráfico 3).




Gráfico 3 - Número médio de esporos/cm², por semana, por pomar.

O pomar da Maiorga apresentou o **maior** número médio de esporos/cm² (0,9), seguido pelos pomares da Picanceira (0,8, de Alcobaça (0,6) e da Sobrena (0,5).

Comparação do número médio de esporos de 2025 com a média dos oito anos de monitorização (2017 a 2024)

Comparando a média de 2017 até 2024* do número médio de esporos/cm², por semana, por pomar, com os da **mesma semana** (semana 47) de **2025** (gráfico 4), verifica-se que os valores **deste ano** são **inferiores** 3,2 vezes no pomar da Sobrena, 1,1 vezes no pomar da Picanceira, **iguais** no pomar da Maiorga e **superiores** 2,8 vezes no pomar de Alcobaça.




Gráfico 4 - Comparação do número médio de esporos/cm², por semana, por pomar de 2025, com média dos anos de 2017 a 2024.

***Nota:** A média de esporos/cm², por semana, do pomar da Picanceira é referente unicamente aos últimos seis anos de monitorização (2019 a 2024), devido a este pomar ter substituído o da Silveira no final de 2018.

A responsabilidade do conteúdo desta informação é do INIAV, I.P.

O GT Estenfiliose agradece à AARA, APAS, CAMPOTEC e ao INIAV, I.P. / ENFVN a disponibilização dos pomares.

O Coordenador do GT Estenfiliose

Entidades Financiadoras desta informação:

