



8ª Informação do GT Estenfiliose

26 de março de 2025

O INIAV, I.P., como coordenador do GT Estenfiliose, informa que na **semana 12** (17 a 24 de março) **os resultados da monitorização** foram os seguintes:

Número médio de conídios

O número médio de conídios/cm², por semana, por pomar, **diminuiu moderadamente** nos pomares da Sobrena e da Maiorga, **diminuiu ligeiramente** no pomar da Picançeira e **aumentou acentuadamente** no pomar de Alcobaça (gráfico 1).




Gráfico 1 - Número médio de conídios/cm², por semana, por pomar.

O pomar da Maiorga apresentou o **maior** número médio de conídios/cm² (1,4), seguido pelos pomares de Alcobaça (0,4), da Sobrena e da Picançeira (0,3).

Número médio de ascósporos

O número médio de ascósporos/cm², por semana, por pomar, **diminuiu moderadamente** nos pomares da Maiorga e de Alcobaça e **aumentou ligeiramente** nos pomares da Sobrena e da Picançeira (gráfico 2).




Gráfico 2 - Número médio de ascósporos/cm², por semana, por pomar.

O pomar da Sobrena apresentou o **maior** número médio de ascósporos/cm² (0,6), seguido pelos pomares da Picançeira (0,3), da Maiorga (0,2) e de Alcobaça (0,1).

Número médio de esporos

O número médio de esporos/cm² (conídios + ascósporos), por semana, por pomar, **diminuiu moderadamente** no pomar da Maiorga, **diminuiu ligeiramente** nos pomares da Sobrena e da Picançeira e **aumentou acentuadamente** no pomar de Alcobaça (gráfico 3).




Gráfico 3 - Número médio de esporos/cm², por semana, por pomar.

O pomar da Maiorga apresentou o **maior** número médio de esporos/cm², (1,5),

seguido pelos pomares da Sobrena (0,9), da Picanceira (0,6) e de Alcobaça (0,5).

Comparação do número médio de esporos de 2025 com a média dos oito anos de monitorização (2017 a 2024)

Comparando a média de 2017 até 2024* do número médio de esporos/cm², por semana, por pomar, com os da **mesma semana** (semana 12) de **2025** (gráfico 4), verifica-se que os valores **deste ano** são **inferiores** 9,6 vezes no pomar da Picanceira; 6,9 vezes no pomar da Sobrena; 4,6 vezes no pomar de Alcobaça e 2,6 vezes no pomar da Maiorga.




Gráfico 4 - Comparação do número médio de esporos/cm², por semana, por pomar de 2025, com a média dos anos de 2017 a 2024.

***Nota:** A média de esporos/cm², por semana, do pomar da Picanceira é referente unicamente aos últimos seis anos de monitorização (2019 a 2024), devido a este pomar ter substituído o da Silveira no final de 2018.

Estados fenológicos dos pomares

No dia **24 de março**, as árvores monitorizadas encontravam-se nos seguintes estados fenológicos:

	Baggiolini	BBCH
Sobrena	B	51
Picanceira	B	51
Maiorga	B	51
Alcobaça	B	51

A responsabilidade do conteúdo desta informação é do INIAV, I.P.

O GT Estenfiliose agradece à AARA, APAS, CAMPOTEC e ao INIAV, I.P. / ENFVN a disponibilização dos pomares.

O Coordenador do GT Estenfiliose

Entidades Financiadoras desta informação:

